

核准日期:

氟哌利多注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用


【药品名称】

通用名称: 氟哌利多注射液
英文名称: Droperidol Injection
汉语拼音: Fupailiduo Zhusheye

【成份】本品主要成份为氟哌利多, 辅料为乳酸。

化学名称: 1-[1-[3-(对-氟苯甲酰基)丙基]-1,2,3,6-四氢-4-吡啶基]-2-苯并咪唑啉酮

化学结构式:



分子式: $C_{21}H_{21}FN_3O$

分子量: 379.43

【性状】本品为无色或微黄色的澄明液体。

【适应症】

1、用于精神分裂症和躁狂症兴奋状态。

2、本品有神经安定作用及增强镇痛药的镇痛作用。与芬太尼合用静脉注射时, 可使病人产生特殊麻醉状态, 称为神经安定镇痛术, 用于大面积烧伤换药, 各种内镜镜检查。

【规格】2ml: 5mg

【用法用量】用于控制急性精神病的兴奋躁动: 肌肉注射一日5~10mg(1支~2支)。用于神经安定镇痛: 5mg(1支)加入0.1mg枸橼酸芬太尼, 在2~3分钟内缓慢静脉注射。

【不良反应】

1、锥体外系反应较常见, 急性肌张力障碍在儿童和青少年更易发生, 出现明显的扭转痉挛, 吞咽困难, 静坐不能及类帕金森病。

2、可出现口干、视物模糊、乏力、便秘、出汗等。

3、可引起血浆中泌乳素浓度增加, 可能有关的症状为: 溢乳、男子女性化乳房、月经失调、闭经。

4、少数病人可引起抑郁反应。

5、可引起注射局部红肿、疼痛、硬结。

6、较少引起低血压。

7、偶见过敏性皮疹及恶性综合征。

【禁忌】基底神经节病变、帕金森病、帕金森综合征、严重

中枢神经抑制状态者、抑郁症及对本品过敏者。

【注意事项】

- 1、下列情况时慎用：心脏病尤其是心绞痛、药物引起的急性中枢神经抑制、癫痫、肝功能损害、青光眼、甲亢或恶性甲状腺肿、肾功能不全、肾功能不全及尿潴留。
- 2、治疗期间应定期检查血常规、肝功能。
- 3、注射液颜色变深或有沉淀时禁止使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

孕妇慎用。哺乳期妇女使用本品期间应停止哺乳。

【儿童用药】 慎用。

【老年用药】 慎用。

【药物相互作用】

- 1、本品与乙醇或其他中枢神经系统抑制药合用、中枢抑制作用增强。
- 2、本品与抗高血压药合用，易致体位性低血压。

【药物过量】

中毒症状：窒息、心跳加快、共济失调、呕吐、发绀、低血压、休克、激动、高热、肌肉僵直、震颤、瞳孔散大、心律失常。严重者神志模糊、甚至心律失常。

处理：保持呼吸道通畅，采取增加排灌措施，并依病情进行相应对症治疗和支持疗法。

【药理毒理】 本品属于酰胺类抗精神病药，抗精神病作用与其阻断脑内多巴胺受体，并可促进脑内多巴胺的转化有关。其特点是体内代谢快，作用维持时间短，还具有安定和增强镇痛作用。

【药代动力学】 本品大部分与血浆蛋白结合，半衰期($t_{1/2}$)约为2.2小时。主要在肝脏代谢，代谢物大部分经尿排出，少部分由粪便排出。

【包装】 2ml无色安瓿，每盒2支；每盒5支。

【贮藏】 遮光，密闭，阴凉处（不超过20℃）保存。

【有效期】 24个月

【执行标准】 卫生部标准1995年版二部第四册

【批准文号】 国药准字H11020578

【生产企业】

企业名称：北京市永康药业有限公司
生产地址：北京市丰台区科学城中核路8号
邮政编码：100070
电话号码：010-83681344
传真号码：010-83681350