

核准日期：xxxx 年 xx 月 xx 日

## 垂体后叶注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

### 【药品名称】

通用名：垂体后叶注射液

英文名：Posterior Pituitary Injection

汉语拼音：Chuitihouye Zhusheye

### 【成份】

本品主要成份为垂体后叶。

### 【性状】

本品为无色澄明或几乎澄明的液体。

### 【适应症】

用于肺、支气管出血（如咳血）消化道出血（呕血、便血），并适用于妇产科催产及产后收缩子宫、止血等。对于腹腔手术后肠道麻痹等亦有功效。本品尚对尿崩症有减少排尿量之作用。

### 【规格】

0.5ml：5 单位

### 【用法用量】

肌内、皮下注射或稀释后静脉滴注。引产或催产：静脉滴注：（1）一次 2.5～5 单位，用氯化钠注射液稀释至每 1ml 中含有 0.01 单位。静滴开始时每分钟不超过 0.001～0.002 单位，每 15～30 分钟增加 0.001～0.002 单位，至达到宫缩与正常分娩期相似，最快每分钟不超过 0.02 单位，通常为每分钟 0.002～0.005 单位。（2）控制产后出血每分钟静滴 0.02～0.04 单位，胎盘排出后可肌内注射 5～10 单位。呼吸道或消化道出血：一次 6～12 单位；产后子宫出血：一次 3～6 单位。

### 【不良反应】

未见详细报道。

### 【禁忌】

本品对患有肾脏炎、心肌炎、血管硬化、骨盆过窄、双胞胎、羊水过多、子宫膨胀过度等病人不易应用。在子宫颈尚未完全扩大时亦不宜采用本品。高血压或冠状动脉病患者慎用。

**【注意事项】**

用药后如出现面色苍白、出汗、心悸、胸闷、腹痛、过敏性休克等，应立即停药。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】**

用于催产时必须明确指征，在密切监视下进行。

**【儿童用药】**

本品在儿童患者中应用的安全性及有效性尚未见确切报道，应慎用。

**【老年用药】**

本品在老年患者中应用的安全性及有效性尚未见确切报道，应慎用。

**【药物相互作用】**

(1) 环丙烷等碳氢化合物吸入全麻时，使用缩宫素可导致产妇出现低血压，窦性心动过缓或（和）房室节律失常。恩氟烷浓度 $>1.5\%$ ，氟烷浓度 $>1.0\%$ 吸入全麻时，子宫对缩宫素的效应减弱。恩氟烷浓度 $>3.0\%$ 可消除反应，并可导致子宫出血。

(2) 其他宫缩药与缩宫素同时用，可使子宫张力过高，产生子宫破裂或（和）宫颈撕裂。

**【药物过量】**

尚不明确。

**【药理毒理】**

垂体后叶注射液对平滑肌有强烈收缩作用，尤以对血管及子宫之基层作用更强，由于剂量不同，可引起子宫节律收缩至强直收缩。对于肠道及膀胱亦能增加张力而使其收缩。此外，垂体后叶尚能抑制排尿。

**【药代动力学】**

尚无详细报道。

**【贮 藏】**

密封，遮光，在冷处（ $2\sim 10^{\circ}\text{C}$ ）保存。

**【包 装】**

安瓿，10支/盒。

**【有 效 期】**

24个月

**【执行标准】**

《中国药典》2005年版二部

**【批准文号】**

国药准字 H11021255

**【生产企业】**

企业名称：北京赛生药业有限公司

生产地址：北京经济技术开发区兴盛街 8 号

邮政编码：100176

电话号码：010—67600320

传真号码：010—67877178

网    址：<http://www.ssyy.com.cn>