

核准日期： 年 月 日

注射用水溶性维生素说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：注射用水溶性维生素

英文名称：Water-soluble vitamin for injection

汉语拼音：Zhusheyong Shuirongxing Weishengsu

【成份】 本品主要成份为多种维生素，每 1000 瓶中组分为：

硝酸硫胺	3.1g	核黄素磷酸钠	4.9g
烟酰胺	40g	盐酸吡哆辛	4.9g
泛酸钠	16.5g	维生素 C 钠	113g
生物素	60mg	叶酸	0.4g
维生素 B ₁₂	5.0mg	甘氨酸	300g
乙二胺四醋酸二钠	0.5g	对羟基苯甲酸甲酯	0.5g

【性状】

本品为淡黄色的疏松块状或粉末状的多种水溶性维生素冻干制剂。

【适应症】

本品系肠外营养不可少的组成部分之一，用以满足成人和儿童每日对水溶性维生素的生理需要。

【规格】

复方

【用法用量】

静脉滴注。成人和体重 10kg 以上儿童，每日一瓶；新生儿及体重不满 10kg 的儿童，每日需要量为本品的十分之一瓶。

在无菌条件下，在配伍性得到保证时本品可用下列溶液 10ml 加以溶解。

- 1、复方脂溶性维生素注射液（II）（供成人和十一岁以上的儿童使用）；
- 2、复方脂溶性维生素注射液（I）（供十一岁以下的儿童使用）；
- 3、脂肪乳注射液；
- 4、无电解质的葡萄糖注射液；
- 5、注射用水；

用上述 1、2 或 3 配制的混合液须加入脂肪乳注射液后再经静脉输注，而用方法 4 或 5 配制的混合液可加入脂肪乳注射液中也可加入葡萄糖注射液中再经静脉输注。

本品溶解后应在无菌条件下立即加入输液中，并在 24 小时内用完。

【不良反应】

对本品中任何一种成分过敏的患者，对本品均可能发生过敏反应。

【禁忌】

对本品中任一成分有过敏的患者禁用。

【注意事项】

- 1、某些高危病人可发生过敏反应；
- 2、本品加入葡萄糖注射液中进行输注时，应注意避光。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

【儿童用药】

新生儿及体重不满 10kg 的儿童，同用法用量项。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

- 1、本品所含维生素 B₆ 能降低左旋多巴的作用；
- 2、本品所含叶酸可降低苯妥英钠的血浆浓度和掩盖恶性贫血的临床表现；
- 3、维生素 B₁₂ 对大剂量羟钴胺治疗某些神经疾病有不利影响。

【药物过量】

水溶性维生素一般不会发生过多症，即使过量摄取，多余的部分也会迅速排泄。

【药理毒理】

据文献报道：本品是静脉营养的一部分，用以补充每日各种水溶性维生素的生理需要，使机体各有关生化反应能正常进行。

【药代动力学】

据文献报道：在体内参与酶系统的组成，多数维生素作为辅酶或辅基的组成成分参与体内的代谢过程。

【贮藏】 遮光，严封，在 15℃ 以下保存。

【包装】 棕色西林瓶。10 瓶/盒。

【有效期】 24 个月

【执行标准】 1996 年部颁第五册

【批准文号】 国药准字 H20055735

【生产企业】

企业名称：北京利祥制药有限公司

生产地址：北京市顺义区林河工业开发区顺康路 64 号

邮政编码：101300

电话号码：010-89451320、89451321

传真号码：010-89451160-8001

网 址：www.liftshine.com.cn