



维生素 C 泡腾片说明书



力度伸

柠檬味

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：维生素 C 泡腾片

商品名称：力度伸®

英文名称：Vitamin C Effervescent Tablets

汉语拼音：Weishengsu C Paotengpian

【成份】

本品每片含维生素 C1 克。辅料为柠檬香精，橙味香精，喹啉黄，糖精钠，碳酸氢钠，氯化钠，蔗糖，酒石酸。

【性状】

本品为白色或略带淡黄色片，片面有散在的小黄点。

【作用类别】

本品为维生素类非处方药药品。

【适应症】

- 1.增强机体抵抗力，用于预防和治疗各种急、慢性传染性疾病或其他疾病。
- 2.用于病后恢复期，创伤愈合期及过敏性疾病的辅助治疗。
- 3.用于预防和治疗坏血病。

【规格】

1 克

【用法用量】

用冷水或温开水溶解后服用，溶解后成为一杯鲜甜美味的柠檬味饮品。成人一日 1 片，儿童一日半片。

【不良反应】

- 1.长期服用每日 2~3 克可引起停药后坏血病，故宜逐渐减量停药。
- 2.长期应用大量维生素 C 可引起尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石。
- 3.过量服用（每日用量 1 克以上）可引起腹泻、皮肤红而亮、头痛、尿频（每日用量 600mg 以上）、恶心呕吐、胃痉挛。

【禁忌】

尚不明确。

【注意事项】

- 1.不宜长期过量服用本品，否则，突然停药有可能出现坏血病症状。
- 2.本品可通过胎盘并分泌入乳汁。孕妇服用过量时，可诱发新生儿产生坏血病。
- 3.下列情况应慎用：（1）半胱氨酸尿症（2）痛风（3）高草酸盐尿症（4）草酸盐沉积症（5）尿酸盐性肾结石（6）葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（7）血色病（8）铁粒幼细胞性贫血或地中海贫血（9）镰形红细胞贫血（10）糖尿病（因维生素 C 干扰血糖定量）。
- 4.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
- 5.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 6.本品性状发生改变时禁止使用。
- 7.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 8.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

- 1.口服大剂量维生素 C 可干扰抗凝药的抗凝效果。
- 2.与巴比妥或扑米酮等合用，可促使维生素 C 的排泄增加。
- 3.纤维素磷酸钠可促使维生素 C 代谢为草酸盐。
- 4.长期或大量应用维生素 C 时，能干扰双硫仑对乙醇的作用。
- 5.水杨酸类能增加维生素 C 的排泄。
- 6.如与其他药物同时使用可能发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品参与机体内抗体及胶原形成，组织修补（包括某些氧化还原作用），苯丙氨酸、酪氨酸、叶酸的代谢，铁、碳水化合物的利用，脂肪、蛋白质的合成，以及维持免疫功能，羟化 5-羟色胺，保持血管的完整，并促进非血红素铁的吸收。

【贮藏】

遮光，密封保存。
药品及包装请勿放在儿童容易接触的地方。
筒盖中有干燥剂，防止误食。请保持筒盖紧闭，避免受热及潮湿。

【包装】

铝管包装。10 片/盒，12 片/盒，15 片/盒，20 片/盒，30 片/盒。

【有效期】

36 个月

【执行标准】

《中国药典》2005 年版二部

【批准文号】

国药准字 H20056946

【说明书修订日期】

【生产企业】

委托方：拜耳医药保健有限公司

注册地址：北京经济技术开发区荣京东街 7 号

邮政编码：100176

市场部联系电话：021 61468282

市场部联系传真：021 61468585

受托方：山东新华制药股份有限公司

生产地址：中国山东省淄博市张店区东一路 14 号

【药物安全咨询电话】

800-810-1828

如有问题可与生产企业联系



Vitamin C Effervescent Tablets-CNL04, Change No.(06)096/15